


Kenali dan Awasi Seputar Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

KIPI merupakan gejala medis terjadi setelah Imunisasi dan diduga terkait dengan imunisasi/vaksinasi, Umumnya reaksi yang timbul adalah **Sakit kepala, mual, mengantuk, sakit kepala, demam, lapar** merupakan hal yang masih wajar dan menghilang dengan sendirinya tanpa pengobatan



Nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan



Demam



Sakit kepala



Lelah atau tidak enak badan



Mengantuk



Mual



Lapar

Vaksinasi menyebabkan sistem kekebalan tubuh penerima bereaksi terhadap antigen yang terkandung didalam vaksin sehingga memicu terbentuknya antibodi.

Ini merupakan hal yang masih wajar, biasanya bersifat sementara dan ringan, serta akan menghilang dengan sendirinya tanpa pengobatan

Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi:

- Tetap tenang
- Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut
- Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat/mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat.
- Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan.

LAPOR !

Jika merasa ada gejala lebih serius, segera datang melaporkan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut